


بیمارستان مهرگان  
MEHRGAN HOSPITAL



## تامپوناد

عنوان	تامپوناد	نام پرونده
کد پمفت	NO-BK-158	
تهیه و تنظیم	واحد آموزش	
تاریخ بازنگری	اردیبهشت ماه 1401	

## چگونه پیشگیری کنیم؟

- رژیم غذایی سالم
- ورزش کافی
- حفظ وزن مناسب
- خود داری از مصرف الکل
- مراجعه منظم به پزشک برای درمان هر گونه مشکل قلبی

# البته در بسیاری از موارد تامپوناد قلبی قابل پیشگیری نیست

تشخیص بیماری چگونه است؟

- پس از انجام معاینات فیزیکی و پرسش سوالاتی در رابطه با سابقه بیماری های شما ، برخی آزمایشات نیز می توانند به تشخیص کمک کنند :
- تست اکو
  - نوار قلب
  - عکسبرداری از قفسه سینه
  - سی تی اسکن یا MRI
  - آزمایش خون برای بررسی های مختلف و علل بیماری
  - آنتیوگرافی قلب


درمان تامپوناد قلبی چگونه است؟

تامپوناد قلبی معمولاً یک شرایط اورژانسی بوده و تخلیه ای فوری مایع پریکارد ضروری می باشد. رایج ترین عملی که به این منظور انجام می شود ، پریکار迪و سنتز است. در این عمل ، از یک سوزن و یک شلنگ بلند و نازک برای خارج کردن مایع از فضای اطراف قلب استفاده می شود . در برخی موارد ، پزشک ممکن است کیسه ای پریکارد را در زمان جراحی تخلیه کند .

معمولًا مدت کمی پس از خارج کردن مایعات اضافی ، علائم بهبود می یابد

## علائم احتمالی به شرح زیر است:

- درد یا ناراحتی قفسه سینه
- تنگی نفس
- تنفس سریع
- افزایش ضربان قلب
- بزرگ شدن رگ های گردن
- ورم دست و پا
- درد در ناحیه قسمت بالایی شکم
- ناراحتی شکم
- تب در صورت وجود عفونت



## بیماری هایی که میتوانند منجر به این مشکل شوند:

- عفونت کیسه پریکارد
- سرطان
- التهاب کیسه پریکارد بر اثر حمله قلبی
- آسیب وارد شده طی عمل های قلبی
- بیماری های خود ایمنی
- حساسیت به برخی داروها
- شیمی درمانی در ناحیه قفسه سینه
- علل متابولیسمی مثل نارسایی مزمن کلیه که می توانند منجر به تجمع مایعات و سموم در بدن شود
- بعد از عمل قلب باز
- گاهی اوقات ، علت بروز Tamponade قلبی مشخص نیست

تمپوناد قلبی ، علائم ، تشخیص ، پیشگیری  
تمپوناد قلبی هنگامی بروز می کند که کیسه مایع اطراف قلب از خون یا مایعی دیگر پر شود و بر قلب فشار وارد کند .

قلب نیز در اثر فشار وارد شده توانایی پر شدن به طور کامل را نداشته ، برون ده خون کاهش یافته و فشار خون افت می کند . آسیب دیدگش و ابتلا به برخی بیماری ها می تواند سبب بروز Tamponade قلبی شود . این بیماری در صورت عدم درمان مرگ بار خواهد بود

بیماری هایی که میتوانند منجر به این مشکل شوند

- عفونت کیسه پریکارد
- سرطان
- التهاب کیسه پریکارد بر اثر حمله قلبی
- آسیب وارد شده طی عمل های قلبی
- بیماری های خود ایمنی
- حساسیت به برخی داروها
- شیمی درمانی در ناحیه قفسه سینه
- علل متابولیسمی مثل نارسایی مزمن کلیه که می توانند منجر به تجمع مایعات و سموم در بدن شود
- بعد از عمل قلب باز
- گاهی اوقات ، علت بروز Tamponade قلبی مشخص نیست

نیست