



بیمارستان مهرگان



مراقبت های پس از آنژیوگرافی

مراقبت پس از آنژیو	عنوان	شناختن بیانیه
NO-BK-56	کد پمپلت	
واحد آموزش	تهیه و تنظیم	
اردیبهشت ماه 1401	تاریخ بازنگری	

۱۷) عزیزانی که آنژیو پلاستی شده
اند مصرف قرص پلاویکس که
نگهدارنده‌ی استنت شما می‌باشد
را روزانه فراموش ننمایید. در
صورتی که دو روز قرص پلاویکس
نخورید استنت شما لخته شده و
سکته قلبی از عوارض آن است.

۱۸) لطفاً طبق دستور پزشک معالج
خود جهت ویزیت مجدد به ایشان
مراجعه ننمایید.

۱۹) از داشتن استرس بپرهیزید و
ثبت اندیشه باشید

۱۱) از خوردن غذاهای چرب و روغن‌های
جامد حیوانی، نباتی، کره و گوشت‌های
چرب و پوست مرغ، بوقلمون و لبنیات
پرچرب، میگو و نمک بپرهیزید.

۱۲) لطفاً از مصرف دخانیات بپرهیزید.

۱۳) درصورتی که دیابتی (قند خون) بالا
دارید حتماً رژیم غذایی خود را رعایت
نمایید..

۱۴) مصرف ماهی تازه و گوشت‌های
سفید را ترجیحاً بیشتر و مصرف گوشت
قرمز را به حداقل برسانید. از غذای نرم
بیشتر استفاده کنید.

۱۵) از انجام فعالیت‌های سنگین
بپرهیزید (مثل بلند کردن اجسام سنگین
، هول دادن ماشین و)

۱۶) درصورتی که آنژیو پلاستی شده‌اید
(داخل رگ شما استنت و یا فنر) گذاشته
شده است از روز دوم پس از ترخیص می‌
توانید به کار خود ادامه دهید.

- ۶) از داشتن بیوست جدا بپرهیزید.
- ۷) در صورت بروز سردرد ، حساسیت پوستی، حالت تهوع ، استفراغ و یا تاری دید و تنگی نفس به پزشک معالج تان و یا به نزدیک ترین مرکز درمانی مراجعه نمایید.
- ۸) داروهای خود را به موقع مصرف نمایید و هیچ دارویی را بدون نظر پزشک تان قطع و یا اضافه ننمایید.
- ۹) رژیم غذایی خود را متناسب با تشخیص داده شده رعایت نمایید.
- ۱۰) مصرف زیاد سبزیجات تازه به شما توصیه می گردد

(در صورت ایجاد سفتی (مثل گردو) در محل آنژیوگرافی و یا داشتن درد غیرطبیعی در محل آنژیو شده حتماً به پزشک معالج مراجعه نمایید و در ساعتی که پزشک شما حضور ندارد به یکی از اورژانس ها و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

۳) روز بعد از ترخیص حمام نمایید و محل آنژیو شده را با کف و صابون بدون کشیدن لیف با آب ولرم به آرامی بشویید و روی محل آنژیو شده آب داغ نریزید.

۴) حتماً از توالت فرنگی استفاده کنید.

۵) از پله بالا یا پایین نروید(حداقل

۴۸ ساعت)

بیمار گرامی اکنون آنژیوگرافی شده اید و آخرین روش تشخیصی برای شما انجام شده است لطفاً پس از ترخیص به نکات ذیل توجه فرمایید.

۱) در صورت بروز خونریزی از محل آنژیوگرافی شده خونسردی خود را حفظ نموده در صورتی که از کشاله ران آنژیو شده اید بلا فاصله دراز کشیده و توسط یکی از افراد خانواده بالای محل خونریزی را مدت ۲۰ دقیقه با انگشتان دست فشار داده شود و اگر از دست آنژیو شده اید فوراً بالای محل خونریزی را مدت ۲۰ دقیقه محکم فشار دهید.