

بیمارستان مهرگان  
MEHRGAN HOSPITAL



## پنومونی نوزاد

عنوان	پنومونی	پذیرش شنبه
کد پمفت	NO-BK-166	
تنظیم و تهیه	واحد آموزش	
تاریخ بازنگری	اردیبهشت ماه 1401	

## درمان

- آنتی بیوتیک درمانی •
- تجویز مایعات تزریقی •
- اکسیژن درمانی •
- درمان تب •

- تمیز کردن راه هوایی و مجاری بینی •
- رعایت حالت نیمه نشسته •
- فیزیوتراپی قفسه سینه •

کنترل وضعیت کودک توسط پزشک و پرستار در حین بستری نوزاد، در موارد زیر حتماً از پرستار کمک بخواهید:  
ادامه تغذیه با شیر مادر (حتماً باید طبق دستور پزشک باشد)

فیزیوتراپی قفسه سینه با تجویز و نظر پزشک مراجعة به پزشک در صورت مشاهده: تنگی نفس و اختلالات تنفسی - کاهش اشتها به کمتر از نصف معمول - بد نفس کشید یا کبود شد اگر بی حال و هیپوتون یا شل شد.

زیر دندۀ ای، فوق جناغی و حرکت پرهای بینی (و در موارد خیلی شدید سیانوز مرکزی) کبودی غشاهاي مخاطی (دیسترس تنفسی شدید و عدم توانایی کودک در نوشیدن شیر یا مایعات دیده می شود).

موارد بستری کودک مبتلا  
• لسن پائین (کمتر از شش ماه)  
• پنومونی خیلی شدید یا با عوارض جانبی  
• وجود برخی بیماری‌های زمینه‌ای (نقص سیستم ایمنی، کم خونی داسی شکل همراه با سندرم حاد قفسه سینه)

عدم تحمل درمان خوراکی یا نیاز به درمان تزریقی (کم آبی، استفراغ مکرر، عدم پاسخ به درمان خوراکی مناسب، عدم آگاهی و همکاری والدین

پنومونی (عفونت ریه)

به التهاب پارانشیم ریه و یا بافت ریه پنومونی گفته می شود.

التهاب ریه از نظر بالینی ممکن است به صورت یک بیماری اولیه یه بعنوان عارضه یک بیماری دیگر اتفاق بیافتد. پس از بیماری های اسهالی یکی از علل شایع مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه، خصوصاً در کودکان زیر ۵ سال پنومونی می باشد.

شیوع این بیماری در کشورهای در حال توسعه تقریباً ۱۰ برابر بیشتر از کشورهای پیشرفته می باشد.

پنومونی در بچه های شیرمادر خوار نسبت به شیرخشک خواربه وضوح کمتر دیده می شود. بیشترین سن ابتلا به این بیماری در فاصله ۱ الی ۵ سالگی است.


پنومونی باکتریایی:  
افزایش تعداد تنفس، سرفه، تحریک پذیری، خواب آلودگی، تغذیه ضعیف، مشکل در نفس کشیدن به صورت: عطش هوای سیانوز (کبود شدن اطراف دهان)، تب، لرزش پره های بینی، رنگ پریدگی، استفراغ، التهاب چشم ها

علائم بالینی

تظاهرات بالینی پنومونی با توجه به عامل مسبب آن مانند سرمه، واکنش سیستمیک وی نسبت به عفونت، وسعت ضایعات و درجه انسداد برونش یا برونشیول ها (راه های هوایی) متفاوت است.

علام پنومونی ها) ویروسی یا باکتریال (معمولاً چند روز پس از بروز یک عفونت دستگاه تنفسی فوقانی به صورت افزایش سرفه و تعداد تنفس (تاکی پنه (بروز پیدا می کند و در موارد شدید افزایش کارت تنفسی) تو کشیده شدن عضلات بین دندنه ای

## پنومونی (ذات الریه)



پنومونی باکتریال در زمستان و اوایل بهار  
شیوع بیشتری داشته و احتمال ابتلا در پسرها  
دو برابر دخترها می باشد.

### تشخیص

■ معاینات فیزیکی

■ تاریخچه سلامتی

■ رادیوگرافی قفسه سینه

■ مطالعات آزمایشگاهی و کشت خون

■ شیوع فصلی در تشخیص پنومونی حائز

اهمیت می باشد.

### انواع پنومونی

پنومونی به چند نوع تقسیم می شود.

■ ویروسی

■ باکتریایی

■ قارچی

■ تنفس مواد خارجی و ...

### علام پنومونی

بر اساس عامل ایجاد کننده، واکنش بدن  
نسبت به عفونت متفاوت است.

#### پنومونی ویروسی:

از نوع باکتریایی شایع تر است. تب، سرفه و  
بی حالی از علائم این عفونت می باشد.