



بیمارستان مهرگان
MEHRGAN HOSPITAL



کیست تخمدان

عنوان	کیست تخمدان	پیشنهاده شده
کد پمفت	NO-BK-95	
تهیه و تنظیم	واحد آموزش	
تاریخ بازنگری	اردیبهشت ماه 1401	

برای اثبات کیست های تخمدان می بایست از سونوگرافی و MRI کمک گرفت لایپاراسکوپی یکی از رایج ترین روش های جراحی ژلیکولوزیست که در این مورد بکار می رود این روش در تایید وجود و اثبات توده های تخمدان روش مهمی است ارزش این روش نه تنها در تشخیص بلکه در درمان توده های تخمدان نیز مطرح است.

آندوترویوز به طور شایع در تخمدان ها رخ می دهد در هنگامی که خونریزی سیکلیک به وقوع می پیوندد کیست آندوترویوما بوجود می آید ترشح خون در این حفره به پیدایش کیست شکلاتی منجر می شود. دردی که به طور تیپلیک در اثر آندوترویوز ایجاد می شود به طور مشابه در آندوترویومای تخمدان بوجود می آید.

علائم بالینی در آندوترویوز قاعده‌گی دردناک ، نزدیکی دردناک و ناباروری

پره اکلامپسی مسمومیت حاملگی

یکی از بیماری های مهم دوره بارداری مسمومیت حاملگی است که خود را با افزایش فشار خون و دقت پروتئین در ادرار و ورم اندام ها نشان می دهد بیماری تقریبا در ۵ نفر از هر هزاران زن حامله رخ می دهد در یک تا دو درصد موارد آن قدر شدید است که زندگی مادر و جنین وی را به خطر می اندازد.

علت بیماری نامشخص است اما به نظر می رسد که عوامل ژنتیکی و دو نقش مهمی در ایجاد آن بازی می کنند به دلایل نامعلوم پر کلمه در حاملگی های اول بیشتر رخ می دهد. فشار خون مادر معمولاً به دنبال زایمان نوزاد و جفت مقدار طبیعی بر می گردد.

تأثیر بیماری بر مادر

فکر می کنم ممکن است در هر زمانی پس از نیمه اول حاملگی رخ دهد اما معمولا در اواخر بارداری شروع می شود

علائم آن عبارتند از افزایش فشار خون و دفع پروتئین در ادرار در موارد شدید امکان دارد مشکلاتی در کلیه کبد مغز و خون بیمار خصوصاً در عوامل انتقادی به وجود آید به سختی می توان پیش بینی کرد که چه کسی به بیماری مبتلا می شود اما گروه خاصی از زنان بیشتر در معرض ابتلاء به بیماری قرار دارند که عبارتند از:

- خانم هایی که بارداری اول خود را می گذرانند
- زنانی که سابقه فشارخون بالا یا بعضی دیگر از بیماری های عروقی را دارند
- زنانی که سابقه پر کلمه را در خانواده دارند
- زنانی که حاملگی چند قلو دارند
- خانم های مبتلا به دیابت

علائم شدید:

اگر بیماری درمان نشود می تواند موجب تشنج نارسایی کلیه نارسایی کبد مشکلات انعقاد خون یا مرگ شود.

برخی از علائم بیماری در مراحل پیش فته عبارتند از:

گیجی سردرد اختلال بینایی درد شکم درست زیر دنده ها تهوع و استفراغ
بیماری ممکن است کاملا بدون علامت باشد
برخلاف تصور عامه هیچ واحد علمی وجود ندارد که نشان دهد گل مسی به علت استرس یا استراحت کم و یا کار سخت به وجود می آید بیماری در مراحل اولیه هیچ علامتی ندارد و بیشتر زنان مبتلا احساس سلامتی می کنند به این دلیل است که معاینات و مراجعات دوره حاملگی اهمیت ویژه ای در تشخیص زودهنگام بیماری دارند زمانی شما مشکوک به شکل مسی هستید که:
• اولین افزایش ناگهانی فشار خون در حد ۹۰ / ۱۴۰ میلیمتر جیوه یا بیشتر داشته باشید
• ثانیاً پروتئین در ادرار شما دفع شود