



گاسترو آنتریت در اطفال

عنوان	عنوان	پذیرش
کد پمفت	NO-BK-20	
تهیه و تنظیم	واحد آموزش	
تاریخ بازنگری	اردیبهشت ماه 1401	

حتما قبل از مصرف آب را یک دقیقه بجوشانید
نحوه انتقال بیماری:

-از طریق آب و غذاهای آلوده

-استفاده مشترک از وسایل

-تماس فیزیکی با فرد آلوده

-استفاده از شیشه شیر جهت تغذیه کودکان و

بهداشتی نبودن این شیشه ها یکی از مهمترین

دلایل شیوع این بیماری در سطح جهان است

گاسترو آنتریت غیرعفونی

برخی از عوامل ایجادکننده ی گاستروآنتریت
غیرعفونی :

-افرادی که بدنشان تحمل لاکتوز را ندارد با

استفاده از غذاهایی که لاکتولوز دارند مانند

شیرگاو به این بیماری مبتلا میشوند و این افراد

دچار آنتریت میشوند ولی علائم گاستریت ندارند

-افرادی که دچار بیماری سلیاک میشوند و با

صرف غذاهایی که دارای گلوتن هستند مانند

گندم و گندم سیاه و دچار گاستروآنتریت

میشوند

پیشگیری از بیماری:

پیشگیری از گسترش اسهال و استفراغ میکروبی

آسان تر است مثلا ظروف تغذیه کودک و نیز

اسباب بازی های او را قبل از استفاده شست و

شو و ضد عفونی کنید و سعی کنید همه ی

اعضای خانواده بهداشت شخصی خود را دقیقا

رعایت کنند

نمیتوان از آلوده شدن کودک به ویروس های

ایجادکننده ی اسهال و استفراغ پیشگیری کرد

اما پس از آلودگی کودک نسبت به ویروس

خاصی که باعث بیماری شده مصونیت می یابدو

دادن شیرمادر به شیرخوار از مهم ترین عامل

کاهش ابتلا به اسهال در شیرخواران است

رعایت بهداشت فردی:

۱/ دست های خود و کودکتان را با آب و صابون

بشویید ۲/ میوه و سبزیجات را ضد عفونی شده

صرف نمایید ۳/ از آب آشامیدنی سالم استفاده

کنید و از مصرف یخ تهیه شده در خارج از منزل

خودداری کنید ۴/ اگر در مناطقی زندگی

میکنید که دسترسی به آب آشامیدنی تصفیه

شده و لوله کشی وجود ندارد

شروع علائم:

اغلب علائم و نشانه ها بین ۱۲ تا ۷۲ ساعت پس از ابتلا شروع میشود و اگر عامل ویروسی باشد معمولاً تا یک هفته طول میکشد و بعضی علائم ویروسی ممکن است همراه با تب و خستگی و سردرد باشد و اگر مدفوع خونی باشد احتمالاً عامل ویروسی نمیباشد و به احتمال زیاد باکتریایی یا انگلی است و عفونت های باکتریایی ممکن است همراه با درد شدید شکمی باشد و هفته ها طول بکشد.

درمان بیماری:

پزشک کودک شما را معاينه میکند و تصمیم میگیرد که درمان در منزل یا بیمارستان انجام شود و درمان در منزل معمولاً شامل رعایت رژیم اسهالی با وعده های غذایی بیشتر در فواصل کمتر {شیرمادر و سوپ و کته و ماست و موز و سیب و مایعات غیرشیرین} تهیه محلول او آرس طبق دستور پزشک و مصرف داروهای تجویز شده ی خوراکی با توجه به سن و شرایط کودک میباشد

در موارد خفیف میتوان گاستروآنتریت را با آبرسانی مناسب از طریق مصرف {آر اور اس} کنترل نمود در موارد شدیدتر از مایعات درون وریدی {سرم} استفاده میشود علائم بیماری شامل "اسهال و استفراغ و بی اشتهایی و درد شکم و ضعف و تب است و اگر کودک شما هر یک از علائم زیر را داشت فوراً با پزشک تماس بگیرید درد شکم و عدم تحمل غذا و امتناع از نوشیدن و فرورفتگی چشم ها و خواب الودگی غیرعادی و ادرار نکردن به میزان کم یا ادرار نکردن و خشک بودن زبان و استفراغ و اسهال مکرر به خصوص اگر آبکی باشد و اسهال خونی

گاستروآنتریت چیست

گاستروآنتریت یا بیماری التهاب معده ای و روده ای که منجر به اسهال و استفراغ و درد شکم و گرفتگی عضلات میشود در کودکان اغلب به صورت شروع اسهال با درد شکم و تب و استفراغ و تهوع میباشد و اسهال معمولاً به صورت دفع حداقل سه نوبت مدفوع شل یا آبکی در ۲۴ ساعت تعریف میشود اسهالی که حداقل ۱۴ روز طول بکشد معمولاً ناشی از عفونت های انگلی است در حالی که اسهال همراه با تغییرات عمومی معمولاً بر اثر توکسین ها یا ویروس ها ایجاد میشود گزارش والدین از علائم کودک. به ارزیابی دهیدراتاسیون {کم آبی بدن} کمک میکند وضعیت دریافت مایعات توسط کودک و میزان اسهال و استفراغ کودک از نظر بالینی اهمیت دارد